

Papaver rhoeas L.



Diğer İsimleri:

Türkçe: Gelincik

İngilizce: Corn poppy

Çevre İstekleri: Su ve bitki besin maddesine iyi kireçli killi ve tınlı toprakları sever. Genellikle tahıllarda sık rastlanır. Çukurova bölgesinde buğdayda bol miktarda bulunmuştur.

Morfolojisi: Tek yıllık, 30-50 cm boyundadır. Sap dik tüylü ve dallanmıştır. Yapraklar çok farklı olup, mat yeşil renkte kenarları derin girintili çıkıntılıdır, yapraklar genellikle bazaldırlar, 30-150 mm büyüklüğündedirler. Çiçekleri kırmızı renkte genellikle, taç yaprakların bağlantı yerlerinde siyah leke vardır, çanak yapraklar çiçeğin açışı sırasında düşerler. Meyve ters yumurta şeklinde kapsüldür, sapa bağlantı yeri yüzüklü, ve 8-12 parçalıdır. Tohum böbrek şeklinde, koyu kahverengi, yaklaşık 0,5 mm büyüklüğündedir.

Diğerleri: Tek bitki 20.000 adet tohum oluşturur, *Papaver* tüylerinin ancak toprak yüzeyine yakın olan tohumları çimlenebilir. Tohumlar çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyarlar ve uzun süre çimlenmeden toprakta kalabilirler (10> yıl). Optimum çimlenme sıcaklığı 7-13°C (min. 2°C, max. 35°C)'dir (Uygur ve ark.,1986).

Kaynak

UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.